

사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

심장질환, 고혈압, 갑상선질환, 당뇨병, 전립샘비대증으로 인한 배뇨곤란 환자

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

혈압강하제, 항우울약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.

1) 이 약 사용에 의해 총혈되어 붉어짐, 부종(부기), 자극감 등의 증상이 나타날 경우

2) 이 약 사용에 의해 알레르기 증상(발진, 총혈되어 붉어짐, 가려움 등)이 나타날 경우. 알레르기 증상으로 인하여 빈도불명하게 치명적인 아나필락시스성 쇼크가 나타날 수 있다.

3) 7일정도 사용하여도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우

4) 출혈이 있는 경우

5. 기타 이 약의 사용시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 어린이에게는 사용하지 말 것.

3) 이 약이 무르게 된 경우에는 잠시 냉각시킨 후에 사용하며 또한 지나치게 단단해진 경우에는 무르게 한 후 사용할 것.

4) 이 약은 직장에만 사용하고 내복용으로는 사용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 좌제는 체온으로 녹기 쉽도록 제조되어 있기 때문에 직사광선이나 온도가 높은 곳을 피하여 서늘한 곳에 보관할 것.

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.